

PATIENTENKARTE

für Topiramat

Für Frauen und Mädchen,
die schwanger werden können –
Empfängnisverhütung und Schwangerschaft



Was Sie wissen müssen

- Dieses Arzneimittel enthält Topiramat und wird zur Behandlung von Epilepsie oder zur Vorbeugung von Migränekopfschmerzen eingesetzt.
- Topiramat kann ein ungeborenes Kind schwerwiegend schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

Was Sie tun müssen

- Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.
- Sie müssen während der Behandlung mit Topiramat und mindestens 4 Wochen nach der letzten Einnahme hoch-

wirksame Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt wird Sie über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.

- Suchen Sie Ihren Arzt mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.
- Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.
- Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramat nur auf Anweisung Ihres Arztes ab, da sich Ihr Zustand sonst verschlechtern kann.

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Patientenleitfaden
oder scannen Sie diesen QR-Code, um ihn zu erhalten:
<https://www.hormosan.com/produkte.php>

Bewahren Sie diese Karte auf.

Version 01, Stand 10/2023

