

## WICHTIG - PATIENTENPASS

Abacavir/Lamivudin Hormosan  
(Abacavir/Lamivudin) Filmbtablets



**Tragen Sie diese Karte immer bei sich!**

Da Abacavir/Lamivudin Hormosan Abacavir enthält, können Patienten, die Abacavir/Lamivudin Hormosan einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese kann lebensbedrohlich sein, wenn Abacavir/Lamivudin Hormosan weiterhin eingenommen wird.

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin Hormosan aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin Hormosan oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel (z. B. Ziagen, Trizivir, Triumeq) ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin Hormosan entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

**Arzt :** \_\_\_\_\_

**Tel. :** \_\_\_\_\_

**SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG**, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin Hormosan absetzen müssen, wenn:

1. Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
2. Sie aus mindestens **ZWEI** der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:
  - Fieber
  - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
  - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
  - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

(siehe Rückseite der Karte)

**Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).**

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin Hormosan wenden Sie sich bitte an die Hormosan Pharma GmbH,  
**Tel.: 069/47 87 30.**

 **HORMOSAN PHARMA**