

# Namuscla® (Mexiletinhydrochlorid)

## Patientenkarte



*Diese Patientenkarte zum Risiko des Auftretens von Herzrhythmusstörungen bei der Anwendung von Namuscla® (Mexiletinhydrochlorid), ist ein verpflichtender Teil der Zulassung.*

*Sie haben diese Patientenkarte von Ihrem Arzt erhalten, bitte lesen sie sie in Verbindung mit der Packungsbeilage sorgfältig durch!*

### **Warum habe ich diese Karte erhalten?**

Namuscla® enthält Mexiletin. Einige Patienten, die Mexiletin einnehmen, können Herzrhythmusstörungen (kardiale Arrhythmien) entwickeln, die lebensbedrohlich sein können.

### **Was sind Symptome von Herzrhythmusstörungen?**

Typische Symptome von Herzrhythmusstörungen sind:

- Ihr Herzschlag fühlt sich zu kräftig oder zu schnell an (Herzklopfen)
- Schmerzen im Brustkorb
- Ungewöhnliche Kopfschmerzen
- Schwitzen
- Kurzatmigkeit, Atemnot
- Benommenheit, Kreislaufschwäche oder Ohnmacht

### **Begeben Sie sich umgehend in die Notaufnahme, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt!**

### **Was sollte ich mit dieser Karte tun?**

- Sie sollten diese Karte stets bei sich tragen. Legen Sie sie zum Beispiel in Ihre Handtasche oder Geldbörse.
- Informieren Sie jeden weiteren Arzt oder das medizinische Fachpersonal (z. B. in der Notaufnahme) darüber, dass Sie Namuscla® aktuell anwenden und zeigen Sie diese Karte vor.

- Informieren Sie Ihren Arzt über alle Arzneimittel die Sie bereits einnehmen oder bevor Sie damit neu beginnen wollen während Sie mit Namuscla® behandelt werden.

**Tragen Sie nachfolgend die Informationen zu Ihrer Behandlung und Ihrem Arzt ein:**

Startdatum der Einnahme von Namuscla®:

---

Name des Patienten:

---

Name des Arztes:

---

Telefonnummer des Arztes:

---

**Was muss ich sonst noch wissen?**

Vor Beginn der Behandlung mit Namuscla® und regelmäßig während der Behandlung sollten Sie sich sorgfältigen Untersuchungen zur Beurteilung Ihrer Herzfunktion unterziehen, einschließlich einer Elektrokardiografie (EKG). Abhängig von Ihrer Herzfunktion müssen Sie eventuell auch vor und nach jeder Dosisanpassung untersucht werden. Befolgen Sie alle Anweisungen Ihres Arztes.

**Nehmen Sie nicht mehr als 3 Kapseln Namuscla® täglich ein. Nehmen Sie keine doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

**Wo erhalte ich weitere Informationen?**

Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage von Namuscla oder kontaktieren Sie [EU-PV@lupin.com](mailto:EU-PV@lupin.com)